

Fam: Engraulidae



Anchovia macrolepidota (Kner, 1863)

Anchoa escamas grandes, Anchoveta escamuda

El sur de Baja y el Golfo de California al norte de Perú.



Engraulis mordax Girard, 1854

Anchoa de California, Anchoveta de California, Anchoveta norteña

Templada; Al sur de Canada al extremo de Baja, la mayor parte del Golfo de California inferior



Cetengraulis mysticetus (Gunther, 1867)

Anchoa agallota, Anchoveta chuchuelo, Anchoveta bocón, Sardina bocona, Boquerón

El sur de California al Golfo de California a Perú, las Islas de Revillagigedo y Galápagos.

Familia Haemulidae



Anisotremus interruptus (Gill, 1862)

Burro ñato, Vieja ñata, Burro bacoco, Bacoco

La parte central de Baja y el Golfo de California a Perú, incluyendo todas las islas oceánicas menos Clipperton.



Anisotremus davidsonii (Steindachner, 1876)

Burro piedrero, Bacoco piedra, Sargo rayado

Centro de California al centro de Baja, y el Golfo de California.

Familia Ariidae



Bagre panamensis (Gill, 1863)

Cuminata Chihuil, Bagre chihuil

El sur de Baja y al Golfo de California al norte de Perú.

Fam: Sciaenidae



Menticirrhus panamensis (Steindachner, 1875)

Zorra panameña, Lambe gurrubata, Chano, berrugato, boca dulce, corvina, muchachita

El sur de Baja y el Golfo de California oriental al centro de Chile


Menticirrhus sp (probablemente *Menticirrhus elongatus* (Günther, 1864), *Menticirrhus nasus* (Günther, 1868) o *Menticirrhus undulatus* (Girard, 1854)



Menticirrhus elongatus (Günther, 1864)

Zorra fina, lambe bocadulce, gurrubata, corvina blanca, boca dulce

El sur de Baja California, sureste del Golfo del California a Perú.




Menticirrhus nasus (Günther, 1868)

Berrugata real, zorra llorona
Baja California al norte de Perú



Menticirrhus undulatus (Girard, 1854)

Berrugata californiana, lambe, lubina de mar blanca
Sur de California al Golfo de California



Umbrina xanti (Gill, 1862).

Polla rayada, Verrugato polla, **Verrugata roncadora**
Sur de Baja y el Golfo de California a Chile, e Isla del Coco.



Umbrina roncador (Jordan & Gilbert, 1882)

Verrugata aleta amarilla, Verrugato ronco.
Punta Concepción, California, hasta el nordeste del Golfo de California.

Fam: Balistidae



Pseudobalistes naufragium (Jordan & Starks en Jordan, 1895)
Chancho fisgón, Pejepuerco de piedra, Chancho con bandas, **Cochito bota**.

El sur de Baja California y la parte central del Golfo de California a Chile, las Galápagos, isla del Coco y Malpelo.

Fam: Tetraodontidae



Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842)

Tamboril anillado, **Botete diana**

El sur de California y el Golfo de California a Perú, incluyendo las Galápagos.



Sphoeroides lobatus (Steindachner, 1870).

Tamboreta narigón, Tumbulero lóbulo, **Botete verrugoso**

El sur de California y los $\frac{3}{4}$ inferiores del Golfo de California a Chile, Galápagos, Islas de Revillagigedo e Isla de Coco.

Fam. Haemulidae



Anisotremus dovii (Günther, 1864)

Burro, Burro cotongo, Burro rompepaila,
La boca del Golfo de California al norte de Perú

Fam: Serranidae



Epinephelus analogus Gill, 1863.

Mero orillero, Cabrilla, **Cabrilla pintada**, Mero moteado, Mero punteado
Sur de California al Golfo de California a Perú, Galápagos, Malpelo y las Islas de Revillagigedo.

Fam: Trichiuridae



Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758), *Trichiurus nitens* (Garman, 1899)

Machete, Pez sable, Pez cinta, cintilla, cinturón de plata, **listón**
Distribución circunglobal en aguas tropicales y templadas, De California a Perú, Islas Galápagos

Fam: Balistidae



Balistes polylepis (Steindachner, 1876)

Pejepuerco coche, Chanco pardo, Cochi
Norte de California al Golfo de California hasta Chile, y todas las islas oceánicas.




Sufflamen verres (Gilbert & Starks, 1904)

Cochito, Chanco cochino, Calafate cochi, Cochito naranja

Baja California central, y los 2/3 inferiores del Golfo de California a Ecuador y todas las islas oceánicas.

Fam: Scianidae


Nota: La curvina puede pertenecer a cualquiera de estos tres géneros (*Cynoscion*, *Atractoscion* o *Ophioscion*). La que tiene marco naranja es la especie más frecuente y probable de ser capturada por las embarcaciones camaroneras.



Cynoscion othonopterus (Jordan y Gilbert, 1881)
Corvina golfina o del Golfo
Golfo de California



Cynoscion parvipinis (Ayres, 1862)
corvina azul, corvina de aleta corta
Sur de California y Golfo de California a Mazatlán




Cynoscion xanthulus (Jordan & Gilbert, 1882)
Corvina de aletas amarillas o de boca anaranjada, corvina norteña
Norte del Golfo de California a Acapulco, México



Cynoscion reticulatus (Günther, 1964)
corvina rayada
Golfo de California a Colombia



Cynoscion squanipinnis (Günther, 1869)
Corvina aguada, corvina peluda
Golfo de California al norte de Perú



Cynoscion stolzmanni (Steindachner, 1879)
corvina coliamarilla
México a Perú



Cynoscion phoxocephalus (Jordan & Gilbert, 1882)

Corvina picuda, Corvina rolliza, Corvina cherela
El sureste del Golfo de California a Perú; vagabundo en las Galápagos.



Cynoscion nannus (Castro-Aguirre & Arvizu-Martinez, 1976)

Corvinata enana, Corvina de profundidad
El suroeste y sureste del Golfo de California a Panamá.



Atractoscion nobilis (Ayres, 1860)

Corvina blanca
De Alaska al Golfo de California



Ophioscion imiceps (Jordan & Gilbert, 1882)

Cococha bocachica, Corvina cocodia
El sur de México a Ecuador.




Ophioscion strabo Gilbert, 1897
China picuda, Corvina bizca
El Golfo de California a Colombia.



Ophioscion vermicularis (Günther, 1867)
Corvina gallinaza, Corvina vermiculada, China cococha
El sur de Baja y el sureste del Golfo de California al norte del Perú.

Nota: La especie chano fue identificada como *Micropogonias sp.*, que puede ser cualquiera de las tres especies siguientes, .siendo la primera la mas probable.



Micropogonias megalops (Gilbert, 1890)
Chano norteño, Corvina ojo grande
El Golfo de California al centro de México.



Micropogonias altipinnis (Günther, 1864)
Corvina agría, Corvina alona, Corvina dorada, Chano sureño
Sur de Baja y el centro del Golfo de California al norte de Perú.




Micropogonias ectenes (Jordan & Gilbert, 1882)
Chano mexicano, Corvina verrugato
Sur de Baja y el Golfo de California central a Acapulco.


Fam: Atherinopsidae



Atherinella eriarcha (Jordan & Gilbert, 1881)
Pejerrey plateado
El sur de Baja y los 2/3 inferiores del Golfo de California a Colombia, las Islas de Revillagigedo e Isla del Coco.




Atherinella nepenthe (Myers & Wade, 1942)
Plateadito marino
El sur de Baja a la boca del Golfo de California a Perú



Atherinops affinis (Ayres, 1860)
pejerrey pescadillo
Pacífico oriental templado; de Canadá al sur de Baja y la parte superior del Golfo de California



Atherinopsis californiensis Girard, 1854
pejerrey mocho
Pacífico nororiental templado; De Oregón al sur de Baja, SW y E central del Golfo de California



Colpichthys hubbsi Crabtree, 1989

pejerrey delta

Endémico para el norte del Golfo de California



Colpichthys regis (Jenkins & Evermann, 1889)

Pejerrey charal


Pacífico Central Tropical: endémico para el norte del Golfo de California, al norte de 28 °N.



Leuresthes sardina (Jenkins & Evermann, 1889)

pejerrey sardina

Pacífico Oriental Mexicano



Leuresthes tenuis (Ayres, 1860)

Pejerrey californiano

De la bahía de Monterey al menos hasta la bahía San Juanico, sur de Baja California, no común al norte de puerto Concepción y sur de puerto Abreojos



Melanorhinus cyanellus (Meek & Hildebrand, 1923)

Pejerrey azulado

Pacífico mexicano



Membras gilberti (Jordan & Bollman, 1890)

pejerrey landia

Del Golfo de California al Norte de Perú

Fam. Carangidae

Nota: El charrito puede ser cualquiera o ambas especies que a continuación se muestran



Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)

Charrito ojón, Jurel ojo grande, ojon, ojetón

Mares tropicales y subtropicales; la parte central de Baja y el Golfo de California a Ecuador y las islas oceánicas.



Trachurus symmetricus (Ayres, 1855)

Charrito, ojón, chicharito ojón

Alaska al sur de Baja California y el suroeste del Golfo de California.

Fam. Elopidae



Elops affinis (Regan, 1909)

Chile, Pez torpedo, Machete del Pacífico Oriental, Chiro, machete
Sur de California a Perú, e Isla del Coco.

Fam: Batrachoididae



Porichthys analis (Hubbs & Schultz, 1939)

Chupalodo, Pez sapo charro, Pez fraile de luto

El sur de Baja y el Golfo de California a México central.

Fam: Nematistiidae



Nematistius pectoralis (Gill, 1862)

Papagallo, Pejegallo, Pejepluma, Plumero, Gallito

El norte de Baja al suroeste y este del Golfo de California a Perú, las Galápagos y Malpelo.

Fam: Rhinobatidae



Rhinobatos glaucostigma (Jordan & Gilbert, 1883)

Guitarra, Guitarra punteada, Diablito, Diablo

Sur de Baja y los 2/3 inferiores del Golfo de California a Perú.



Rhinobatos productus (Ayres, 1854)

Guitarra trompa de pala, Guitarra viola

California Central al Golfo de California.

Fam: Paralichthyidae

NOTA: El término lenguado implica un gran número de especies, en este caso las especies que se capturaron en este crucero tienen al pie de figura la descripción en un marco color naranja. Las que tienen marco blanco habitan la región y son muy susceptibles de ser capturados por las embarcaciones camaroneras del pacífico oriental mexicano.



Cyclopsetta querna (Jordan & Bollman, 1890)

Lenguado dientón, Lenguado con caninos


El Golfo de California a Perú.




Cyclopsetta panamensis (Steindachner, 1875)
Lenguado sureño, Lenguado boca de Dios, Lenguado panámico
La parte sur de Baja y el Golfo de California central a Perú.



Citharichthys gilberti Jenkins & Evermann, 1889
Lenguado tapadera, Lenguado boca grande
Baja California central al Golfo de California central a Perú; las Islas de
Revillagigedo, las Islas Galapagos.



Citharichthys fragilis (Gilbert, 1890)
Lenguado flaco, Lenguado del Golfo
California a Baja y el Golfo de California.



Citharichthys gordae (Beebe & Tee-Van, 1938)
Lenguado escondido, Lenguado arenero
El extremo de Baja y el Golfo de California centro-oriental.




Paralichthys woolmani Jordan & Williams en Gilbert, 1897
Lenguado huarache
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú, las Galápagos




Ancylosetta dendritica Gilbert, 1890
Lenguado tres ojos
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú y Malpelo.



Etropus ciadi (Van der Heiden & Plascencia 2005)
Lenguado de Cortés
Conocido solamente del lado este del Golfo de California.




Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882
Lenguado ribete, Lenguado boca chica
Presente en el Atlántico occidental y el Pacífico oriental; en nuestra área de



Etropus peruvianus (Hildebrand, 1946)
Lenguado zapatilla, Lenguado peruano
El Golfo de California al norte de Perú.




Hippoglossina bollmani (Gilbert, 1890)
Lenguado pintado
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú e las Galápagos y Isla del Coco.



Hippoglossina stomata (Eigenmann & Eigenmann, 1890)
Lenguado manchado, Lenguado bocón
California al Golfo de California.



Hippoglossina tetraphthalma (Gilbert, 1890)
Lenguado cuatrojos
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú.



Syacium latifrons (Jordan & Gilbert, 1882)
Lenguado playero
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú



Syacium ovale (Günther, 1864)
Lenguado ovalado, Lenguado pega-pega
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú; las Islas de Revillagigedo y raramente en las Galápagos.




Xystreureys liolepis (Jordan & Gilbert, 1880)
Lenguado cola abanico
El sur de California al Golfo de California.

Fam: Bothidae




Engyophrys sanctilaurentii (Jordan & Bollman, 1890)
Lenguado cola manchada
Del sur de California al Golfo de California a Perú y Malpelo



Monolene asaedai Clark, 1936
Lenguado carbón, lenguado asaedae


Pacífico Oriental Central: De México a Panamá



Monolene maculipinna Norman, 1933

Lenguado de profundidad

Pacífico mexicano, de Nicaragua a Perú y las Galápagos



Bothus constellatus (Jordan, 1889)

Lenguado hoja, platija, lenguado redondo,

Bahía Magdalena (BCS, México) y el Golfo de California a Perú, incluyendo las islas Galápagos

Fam: Scorpaenidae



Scorpaena russula (Jordan & Bollman, 1890)

Lapón sapo, Escorpión sapo

El sur de Baja y el Golfo de California al norte de Perú, Malpelo e Isla del Coco.

Fam: Mugilidae



Mugil curema (Valenciennes en Cuvier & Valenciennes, 1836)

Lisa blanca, Lisa criolla

Costas Pacífica y Atlántica de América y en el oeste de África, principalmente en aguas tropicales; en el Pacífico Oriental desde el sur de California al Golfo de California a Chile y las Islas de Revillagigedo, Galápagos y del Coco.



Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

Lisa pardete, Lisa común, Lisa rayada


Circunglobal en aguas templadas y tropicales; Sur de California al Golfo de California a Perú y las Galápagos y isla del Coco.



Mugil hospes (Jordan & Culver en Jordan, 1895)

Lisa verde, Lisa hospe

Costa Atlántica y Pacífica de América, principalmente en aguas tropicales; en el Pacífico Oriental del sur de Baja y el Golfo de California a Ecuador.




Mugil setosus (Gilbert, 1892)

Lisa liseta

La punta de Baja y el sureste del Golfo de California a Ecuador y las Islas de Revillagigedo.

Fam: Mobulidae




Manta birostris (Walbaum, 1792)

Mantarraya, Manta voladora, Manta gigante

Circuntropical; todas partes de nuestra región, excepto el norte del Golfo de California.



Mobula munkiana (Notabartolo di Sciara, 1987)
Manta de Munk, Manta diabla, Manta enana, Manta chica
El Golfo de California a Perú; las Galápagos, Malpelo e isla del Coco.



Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
Diablo chupasangre, Manta doblada
Probablemente circuntropical; conocida del Pacífico Oriental y Occidental, Atlántico Occidental y Océano Indico; desde el Golfo de California central a Chile.

Fam. Guerreidae



Eucinostomus gracilis (Gill, 1862)
Palmito fino, Mojarra delgada, Mojarra charrita, mojarrita
Baja California Sur y el Golfo de California a Ecuador y las Galápagos.

Fam: Carangidae



Oligoplites altus (Günther, 1869)
Monda, cacama, jurel, palometa, quiebra cuchillos, cuero amarillo
Golfo de California a Ecuador



Oligoplites refulgens Gilbert & Starks, 1904
Cuero flaco, zapatero raspa balsa, Cuero ojoa, Piña flaca, volador, monda
El sur de Baja y el Golfo de California a Ecuador y Malpelo.




Oligoplites refulgens Gilbert & Starks, 1904
Cuero flaco, zapatero raspa balsa, Cuero oja, Piña flaca, volador, monda
El sur de Baja y el Golfo de California a Ecuador y Malpelo.

Fam: Pomacentridae



Abudefduf troschellii (Gill, 1862)
Pintaño amarillo, Petaca chopá, Petaca banderita, Sargento mayor; **Mulegino**; Pintano,
Sargento mayor de Panamá, Castañeta manchada (Perú)
El sur de California al Golfo de California a Perú central, incluyendo todas las islas oceánicas.

Fam: Stromateidae



Peprilus medius (Peters, 1869)
Palometa cometrápo, Pampanito aleta larga, Palometa común
El oeste y este central del Golfo de California al norte de Chile, y las Galápagos.



Peprilus snyderi (Gilbert & Starks, 1904)
Palometa salema, Pampanito aleta corta
El sur de Baja y el Golfo de California al norte de Perú.

Fam: Carangidae



Trachinotus Kennedy (Steindachner, 1876)

Pámpano gitano, Pámpano común, Pámpano toro

La parte central de Baja y las partes suroeste y este central del Golfo de California a Perú.



Trachinotus paitensis (Cuvier en Cuvier & Valenciennes, 1832)

Pámpano paloma

Baja California a Chile, las Galápagos y Malpelo.



Trachinotus rhodopus (Gill, 1863)

Pámpano rayado, Pámpano fino, Pampanito

El sur de California al Golfo de California a Perú, Isla del Coco, las Galápagos e Isla Malpelo.

Fam. Carangidae



Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869)
Pargo de la mancha, Pargo lunarejo, Pargo flamenco
El sur de California al Golfo de California a Perú.

Amphiprion sp (payaso)

Fam: Polynemidae



Polydactylus approximans (Lay & Bennett, 1839)
Ratón, Bobo blanco, Barbudo de seis barbas, Barbudo azul
Centro de California a Baja California y el Golfo de California a Chile, la Isla del Coco.



Polydactylus opercularis (Gill, 1863)
Ratón, Bobo amarillo, Barbudo de nueve barbas
Sur de California al Golfo de California a Chile.

Fam. Rajidae



Raja cortezensis McEachran and Miyake, 1988
Raya de Cortez
Baja California Sur y los 2/3 inferiores del Golfo de California a Panamá.



Raja equatorialis Jordan and Bollman, 1890
Raya, raya ecuatorial
Sur de baja y del Golfo de California a Perú y Cocos



Raja velezi Chirichigno F., 1973
Raya chillona
Los 3/4 inferiores del Golfo de California a Perú, las islas Galapagos y Malpelo

Fam: Gymnuridae



Gymnura marmorata (Cooper, 1864)
Raya-mariposa de California, Tuyo de California, Raya-mariposa californiana
Sur de California al Golfo de California al norte de Perú, y Malpelo.

Fam. Haemulidae


Nota: El roncacho se designo como *Pamadasys sp* y puede ser cualquiera de las especies que se muestran de este genero. Algunas especies del genero *Haemulopsis* también son llamados roncachos



Pomadasys panamensis (Steindachner, 1876)
Roncacho mapache, Ronco jupón, Corocoro mapache, Vieja jupona, Ronco blanco
El sur de Baja y el Golfo de California a Perú.



Pomadasys branickii (Steindachner, 1879)
Ronco burro, Roncador gallinazo, Corocoro carruco, Roncacho arenero
El sur de Baja y los 2/3 inferiores del Golfo de California a Perú.



Pomadasys macracanthus (Günther, 1864)
Ronco espina larga, Corocoro coche, Roncacho gordo
El sur de Baja y el Golfo de California a Ecuador.



Haemulopsis leuciscus (Günther, 1864)
Ronco roncacho, burrito, Ronco chinilla, Ronco ruco
El centro de Baja y el Golfo de California a Perú.



Haemulopsis elongatus (Steindachner, 1879)

Ronco trompudo, Ronco alargado

El sur de Baja y los 3/4 inferiores del Golfo de California a Perú.



Haemulopsis nitidus (Steindachner, 1869)

Ronco espina corta, Ronco brillante

El sur de Baja y el Golfo de California a Ecuador.



Orthopristis reddingi (Jordan & Richardson en Jordan, 1895)

Corocoro dorado, Corocoro bronceado, Burrito rayado, Roncacho, rayadillo

La parte central de Baja y el Golfo de California al sur de México.



Orthopristis chalceus (Günther, 1864)

Corcovado zapata, Burrito corcovado

El sur de Baja y el Golfo de California a Perú, incluyendo las Galápagos.

Fam: Clupeidae



Opisthonema libertate (Günther, 1867)

Sardina crinuda, Sardina-gallera común, Sardina-gallera pecosa, Machuelo hebra pinchagua, Arenque de hebra común,
El sur de California al Golfo de California a Chile y las Galápagos.



Opisthonema bulleri (Regan, 1904)
Machuelo hebra del Pacífico, Sardina-gallera fina, Sardina crinuda azul
El este del Golfo de California a Perú.



Opisthonema medirastre (Berry & Barrett, 1963)
Sardina crinuda machete, Machuelo-hebra acemite, Sardina-gallera plateada,
El sur de California a los 2/3 inferior del Golfo de California y al norte de Perú.




Sardinops sagax sagax (Jenyns, 1842)
Sardina Monterrey, Sardina de California y Perú
En el norte: de Alaska al Golfo de California y las Islas de Revillagigedo; en el sur: del sur de Ecuador a Chile y las Galápagos

Fam: Scombridae



Scomberomorus sierra Jordan & Starks en Jordan, 1895
Sierra común, Macarela sierra, Sierra del Pacífico
Sur de California y el Golfo de California a Chile, incluyendo las Galápagos, Isla del Coco y Malpelo.



Scomberomorus concolor (Lockington, 1879)
Sierra golfin, Carite de Monterey
Con dos poblaciones separadas, una en California hacia el sur hasta el borde entre EEUU y México y la otra en los dos tercios superiores del Golfo de California. Debido a la sobre pesca, la población de California está extinta y la población del Golfo de California se restringe en un área pequeña en el norte del Golfo


Fam: Triakidae



Mustelus californicus (Gill, 1864)
Musola gris, Tiburón cazón mamón
California al Golfo de California y Méjico central.



Mustelus lunulatus (Jordan & Gilbert, 1882)
Musola segadora , Tiburón mamón común, Tiburón cazón segador
El sur de California a Perú; las Galápagos y Malpelo.



Mustelus dorsalis (Gill, 1864)
Musola blanca, tiburón mamón enano, tiburón cazón tripa
La punta de Baja California y México central a Perú y Malpelo.

Fam. Carangidae




Caranx caninus (Günther, 1867)
Jurel toro, toro, torito
El Sur de California al Golfo de California a Perú y la Islas de Revillagigedo, las Galápagos, del Coco y Malpelo.

Fam: Triglidae



Prionotus horrens (Richardson, 1844)
Cabro gigante, Rubio polla, Cabro común, vaca, vaquita
El sur de Baja y el suroeste y este del Golfo de California a Perú.



Prionotus stephanophrys (Lockington, 1881)
Cabro volador, vaca voladora, vaquita voladora
Baja California Sur y el golfo de California a Perú, y las Galápagos.

Fam: Exocoetidae


NOTA: Los peces voladores pertenecen a la familia Exocoetidae y cualquiera de las especies que a continuación se muestran puede ser capturada por las embarcaciones camaroneras del Pacífico mexicano.



Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1847)
Volador aleta negra, Volador ala negra
Circunsubtropical, California a la parte sur de Baja, en
Golfo de California a Chile y las islas oceánicas



Hirundichthys speculiger (Valenciennes, 1847)
Volador espejo
Circumtropical; las islas oceánicas y la boca del
Golfo de California a Ecuador.



Prognichthys tringa Breder, 1928

Volador tringa, Volador panámico

Del Golfo de California a Ecuador, las Islas de Revillagigedo, Malpelo y las Galápagos



Fodiator rostratus (Günther, 1866)

Volador mentón picudo, Gorrión picudo

Endémico para el Pacífico Oriental, desde California y el Golfo de California a Chile, Clipperton y las Galápagos.